

# LE TEST DE L'APS

POUR DÉPISTER LE CANCER DE LA PROSTATE

S'il est dépisté tôt, le taux de survie au cancer de la prostate avoisine 100 % après cinq ans. Par contre, s'il est dépisté tardivement, le taux de survie chute à 28 %. Le test de l'APS est le meilleur moyen de dépister tôt le cancer de la prostate.



Posez les questions suivantes à votre médecin au sujet du test de l'APS :

De quoi s'agit-il?

1



- Analyse sanguine qui mesure la quantité d'antigène prostatique spécifique (APS).
- Il est normal d'avoir de l'APS dans le sang, mais des taux élevés peuvent être un indice d'un problème, peut-être d'un cancer de la prostate.

Devrais-je subir un test?

2



- Avant de décider de subir un test, parlez des avantages et des inconvénients avec votre médecin.

Est-ce que je cours un risque?

3



- Vous pouvez courir un risque supérieur si
- vous avez plus de 50 ans - le risque augmente avec l'âge;
  - vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate;
  - vous êtes de race noire.

# LE TEST DE L'APS

POUR DÉPISTER  
LE CANCER DE LA PROSTATE



Posez les questions suivantes à votre médecin au sujet du test de l'APS :

Quand  
devrais-je  
commencer les tests?

4



- 50 ans
- 45 ans en cas de risque élevé

À  
quelle fréquence?

5



- Tout dépend de votre taux d'APS, qui peut varier d'un homme à l'autre.

Quand  
devrais-je arrêter?

6



- Tout dépend de votre taux d'APS, de votre âge et de votre état de santé général.
- Habituellement, à 70 ans.
- Dans la soixantaine, si votre taux d'APS est faible.

Pour plus d'informations: [prostatecancer.ca/APS](http://prostatecancer.ca/APS)

1-888-255-0333  
[info@prostatecancer.ca](mailto:info@prostatecancer.ca)